

蜂螫咬中毒：

〔定義〕

被蜂尾的毒囊和利針刺入皮膚釋放毒液而引起。

〔症狀〕

一般蜂螫傷，局部有紅腫、疼痛，數小時即可自癒，少數人出現水泡或壞死。驚動群蜂而被多處螫傷後，可能有全身症狀，如發燒、噁心、嘔吐、腹瀉、煩躁不安、以致痙攣、昏迷。對蜂毒有過敏者，立即發生全身性蕁麻疹、喉頭水腫、氣管痙攣，以致過敏休克。

〔護理要點〕

1. 傷者保持鎮靜，如有毒刺遺留，應立即用針頭完全挑出。
2. 用紗布或棉花沾氨水敷蓋患部 5—10 分鐘，以中和毒素(尿液亦可)。
3. 局部冷敷、止痛。若有過敏、休克情形，應儘速送醫。

〔預防〕

1. 野外活動時戴白色帽子，穿淺色衣服，不宜使用香水。
2. 若遇蜂窩，無萬全準備，不要去摘取。
3. 若遇蜂襲，儘量包住身體，減少被咬部位。

隱翅蟲：

〔定義〕

是最常見的小甲蟲。只有 1 公分左右，頭、翅鞘及腹末成黑色，其餘部分則成橘紅色，乍看之下，宛如大螞蟻一般。

牠們生活於草叢之間，也常見於稻叢基部，不咬人，但每當除草，割稻期間，由於棲息所遭破壞，會到處活動。入夜則飛至燈下(有趨光性)，如住家無紗窗，此蟲會登堂入室。

〔症狀〕

1. 當人熟睡時，頸部及鼠蹊等處，便會覺得癢而伸手搔癢，在搔癢時往往會傷及此蟲，於是其體內所含的隱翅蟲毒素會塗佈皮膚而引起潰瘍，亦可能引起過敏反應，造成帶狀水泡傷痕，患處會覺紅腫、灼痛。(若此蟲在皮膚上爬行，可以吹氣方式將其吹走，勿用手撥之。)
2. 隱翅蟲進入人眼，可能會引起結膜炎。裝設紗門、紗窗，以減少此蟲因光而進入屋內的機會。

〔護理要點〕

1. 若遭此蟲害，應清洗傷口，拭乾之後在患部塗敷石碳酸氧化鋅軟膏。

2. 若症狀嚴重，由醫師給藥，口服抗組織胺類藥劑，或注射消炎針劑。